

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C.C.P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

DLP 21-7-70 079017

Supplément n° 2 au Bulletin du mois de Juillet 1970

17 Juillet 1970

Information

## GRANDES CULTURES

- MAIS -

### PYRALE DU MAIS

Comme prévu lors de notre dernière note, le nombre des pontes de Pyrale a très sensiblement augmenté à partir du 12 Juillet, dans les cultures de la HARDT et de nouvelles pontes sont déposées.

Dans cette région, le traitement insecticide devrait être réalisé dans les meilleurs délais sur les parcelles non protégées jusqu'à ce jour.

En dehors de cette zone, particulièrement favorable à l'activité de la Pyrale, le pourcentage des pontes observées est actuellement extrêmement faible.

Par contre, la plupart des maïs arrivent au stade où le traitement devrait être exécuté (panicules mâles visibles dans la plus grande majorité des cornets).

Aussi, nous recommandons aux exploitants de procéder à des comptages de pontes dans leurs parcelles avant de prendre la décision de traiter.

On considère généralement qu'un traitement est économiquement rentable si l'on observe, pour 100 pieds de maïs contrôlés, une ou plusieurs pontes sur 15 pieds.

Lorsque les épis mâles sont complètement dégagés, la perte importante de granulés tombant au sol rend l'intervention aléatoire.

Avertissement

## HOUBLON

### MILDIOU

La floraison débute dans les houblonnières les plus avancées. A ce stade, les houblons étant très sensibles aux attaques de Mildiou, nous conseillons de prévoir un nouveau traitement fongicide avant le 22 Juillet. Avoir soin de toucher l'extrémité des lianes.

## POMMES DE TERRE

### MILDIOU

Les premières taches de Mildiou sont apparues depuis quelques jours et des repiquages sont à craindre après la période pluvieuse que nous traversons actuellement. Sur les variétés sensibles à cette maladie, un traitement fongicide s'avère indispensable. Intervenir dès réception de la présente note.

## ARBRES FRUITIERS

### CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Bien que les vols se terminent en cage d'élevage, la période du 12 au 14 Juillet derniers fut favorable à l'activité de ce ravageur et de nouvelles pontes sont déposées. Renouveler la protection insecticide des vergers dans la période du 20 au 22 Juillet.

Le Responsable de la Station  
D'Avvertissements Agricoles :  
C. GACHON.

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux :  
J. HARRANGER.

90